

沖縄県より、セグロウリミバエまん延防止対策に関するお知らせ

- ▶国内未発生の害虫であるセグロウリミバエが確認されております。
- ▶セグロウリミバエが確認されている本島地域では、当害虫に対して、別紙の農薬を使用して防除が行えます。
- ▶セグロウリミバエに対する農薬の散布についてのご相談や疑わしい虫を発見した際は、沖縄県病害虫防除技術センターへご連絡ください。

※下記農薬はセグロウリミバエに対して登録はありませんが、植物防疫法第29条第1項の規定による防除を行うために使用する農薬として、使用が可能です。

※また、下記希釈倍率、使用方法、使用時期、散布量、回数を守ることで、出荷停止等、流通に支障が出ることもありません。

※農薬を使用する際には、ラベルに記載されている内容をかならず確認してください

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel：098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel：098-866-2280

【使用農薬リスト】

【作成：沖縄県営農支援課】

○にがうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剂
協友ダントツ水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剂
スタークル顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剂	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	アセタミプリド水溶剂
モスピラン顆粒水溶剂	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剂	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクトラ顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	チアメトキシサム水溶剂
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

○きゅうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剂
協友ダントツ水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剂
スタークル顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)	アセタミプリド水溶剂
モスピラン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクトラ顆粒水溶剂	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキシサム水溶剂
日曹スカウトフロアブル	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	4回以内	4回以内	トラロメトリン水和剤
テルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ビフェントリン水和剤
I S Kテルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイマブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	フルバリネット水和剤
マブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	—	3回以内	3回以内	マラソン粉剤

○きゅうり(施設栽培)

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常溫煙霧は合計3回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

○かぼちゃ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイマブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫21日前まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	フルバリネート水和剤
マブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫21日前まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	—	5回以内	5回以内	マラソン粉剤

○とうがん

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			

○すいか

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	イミダクロプリド水和剤
アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
日農アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤
日豊スカウトフロアブル	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	トラロメトリン水和剤
日農ハチハチフロアブル	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	トルフェンピラド水和剤
ハチハチフロアブル	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイマブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	フルバリネート水和剤
マブリック水和剤 20	4,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	6回以内	6回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	—	6回以内	6回以内	マラソン粉剤

○メロン

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	4回以内	4回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
オリオン水和剤 4 0	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	アラニカルブ水和剤
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	イミダクロプリド水和剤
アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	150～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤
日曹スカウトフロアブル	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	トラロメトリン水和剤
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイマブリック水和剤 2 0	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	フルバリネット水和剤
マブリック水和剤 2 0	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫7日前まで	－	3回以内	3回以内	マラソン粉剤

○食用へちま

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	チアメトキサム水溶剤

○うり類（漬物用）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

※うり類（漬物用）には、モーウイ（赤毛ウリ）、食用へちま、食用ひょうたん、シロウリ、漬物用すいか、漬物用まくわうり、漬物用メロン、とうがん、はやとうり、ゆうがおを含みます

○ズッキーニ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

○まくわうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	ジノデフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	4回以内	4回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

○しろうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	—	3回以内	3回以内	マラソン粉剤

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel : 098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel : 098-866-2280

【使用農薬リスト】

○さやいんげん

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノデフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日産エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a	1回以内	1回以内	P A P 乳剤
ホクコーエルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			
日農エルサン乳剤	1,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫 7 日前まで	—	3回以内	3回以内	マラソン粉剤

○豆類(未成熟、ただし、だいずを除く)

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	1,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel : 098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel : 098-866-2280

【使用農薬リスト】

〇ししとう

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アクトラ顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の種穴処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤

〇とうがらし類

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

※とうがらし類は、甘長とうがらし、ししとう、トウガラシ、ノバネロ、ピカンテをふくみます。

〇とうがらし類（ししとうを除く）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アクトラ顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時の種穴処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤

〇とうがらし類（甘長とうがらしを除く）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel：098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel：098-866-2280

【使用農薬リスト】

〇ピーマン

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農アグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクタラ顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	—	5回以内	5回以内	マラソン粉剤

〇ピーマン（施設栽培）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel：098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel：098-866-2280

【使用農薬リスト】

○トマト

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農アグロスリン水和剤	1,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	チアメトキサム水溶剤
テルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	ビフェントリン水和剤
I S Kテルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ビリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
一農マラソン乳剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	5回以内	5回以内	マラソン乳剤
サンケイマラソン乳剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
マラソン粉剤 3	3kg/10a	散布	収穫前日まで	－	5回以内	5回以内	マラソン粉剤

○ミニトマト

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	シベルメトリン水和剤
クミアイアグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
日農アグロスリン水和剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	3回以内 (粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内)	チアメトキサム水溶剤
テルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	ビフェントリン水和剤
I S Kテルスターフロアブル	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			
クミアイコルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	ビリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤	4,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L/10a			

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel : 098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel : 098-866-2280

【使用農薬リスト】

○パッションフルーツ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
モスピラン水溶剤	2,000倍	散布	収穫30日前まで	200～700L/10a	2回以内	2回以内	アセタミプリド水溶剤
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫30日前まで	200～700L/10a			
日農モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	散布	収穫30日前まで	200～700L/10a			

○ピタヤ（ドラゴンフルーツ）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アドマイヤーフロアブル	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a	2回以内	2回以内	イミダクロプリド水和剤
クミアイアドマイヤーフロアブル	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L/10a			

○パパイヤ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a	3回以内	3回以内	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L/10a			

○ゲアバ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	200～700L/10a	2回以内	3回以内	チアメトキサム

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センターTel：098-886-3880

沖縄県農林水産部営農支援課 Tel：098-866-2280